



دستورالعمل تجویز رادیودارو به خانمها در سن باروری

- ✚ لازم است از عدم بارداری بیماران خانم اطمینان پیدا نمود و موکداً توصیه می شود از بیمار گواهی عدم بارداری به همراه امضا و اثر انگشت دریافت شود.
- ✚ از بیمار خانمی که در سنین باروری هستند شرحی از وضعیت قاعدگی گرفته شود و چنانچه نامنظمی در سیکل قاعدگی مشاهده می شود، برای اطمینان از عدم بارداری تست حاملگی درخواست شود. سعی شود که به فرد باردار یا شیرده دوزی تجویز نشود و اگر الزامی بود بر طبق نوع مواد توصیه های لازمه را اجرا کند.
- ✚ برای بیماران باردار طی نامه ای علت عدم انجام اسکن به پزشک معالج بیمار توضیح داده شود و نوبت انجام اسکن بیمار به زمان دیگری موکول گردد.

عدم شیردهی به کودکان برای خانمهای شیرده

- ✚ لازم است از شیر دادن خانمهای شیرده به کودکان چندین ساعت پس از پرتوگیری بسته به نوع و میزان رادیوداروی دریافتی ممانعت به عمل آید. برای این دسته از بیماران لازم است پزشک بر درخواست و نحوه اجرای اسکن نظارت نماید.
- ✚ 24 ساعت در صورت تجویز رادیوداروی تکنیسیم
- ✚ یک ماه در صورت تجویز رادیوداروی گالیوم
- ✚ 3 هفته در صورت تجویز رادیوداروی تالیوم
- ✚ 5 روز تا 68 روز در صورت تجویز رادیوداروی ید 131 بسته به دز تجویزی